





Serín verdecillo /Serin (*Serinus serinus*)

Salamanca: Residente

Ave de pequeño tamaño, con una cabeza proporcionalmente grande y un pico pequeño. El manto y partes inferiores tienen un fuerte estriado. La ceja pálida (más marcada en los machos) continúa hasta los laterales del cuello, remarcando la mejilla. Obispillo de color claro, de un amarillo más marcado en los machos y más pálido y verdoso en hembras, de igual manera que sucede con las marcas faciales y el pecho, mucho más amarillas en el macho. Abundante, presente en un amplio rango de hábitats arbolados en mayor o menor medida, y también en zonas urbanas como jardines o huertos.



Jilguero lúgano /Siskin (*Spinus spinus*)

Salamanca: Invernante


De tamaño medio-pequeño, estilizado, con un pico más grande, largo y cónico que el verdecillo, destaca a simple vista por el contraste de negro y amarillo en sus alas. La base de la cola y el obispillo son amarillentos (más marcado en el macho), y tiene un barrado difuso en el manto y más marcado en los flancos (más visible en las hembras, que presentan también cierto barrado en el pecho). El dimorfismo sexual es acusado en los colores y en el capirote y mentón negros del macho. Son habituales en tramos fluviales donde se alimentan en alisos y abedules, y en zonas boscosas con presencia de coníferas, especialmente pinos.



Jilguero común /Goldfinch (*Carduelis carduelis*)

Salamanca: Residente


Inconfundible. De tamaño medio con un pico relativamente largo y cónico, destaca sobremanera con su cara roja, blanca con borde negro, y el amarillo visible en sus alas. En vuelo es de las aves más fáciles de identificar con el gran contraste de negro con la barra alar amarilla, contrastando con su cuerpo marrón y llamativa cabeza. El obispillo a diferencia del lúgano, es blanco. El dimorfismo sexual no es apreciable en campo. Son frecuentes en hábitats diversos.



Verderón serrano /Citril finch (*Carduelis citrinella*)

Salamanca: Rareza, posible reproductor/invernante en sierras del sur de la provincia



Tamaño medio-pequeño (como el lúgano), con un pico relativamente corto. Tiene tonos verdes en el manto, frente y zonas inferiores, contrastando suavemente con el gris de la cabeza, cuello y flancos. Una apariencia bastante lisa (menos juveniles), con un estriado fino y difuso en el manto flancos, a veces inapreciable. Las alas son de color oscuro (menos que el lúgano), con dos bandas alares amarillo-verdosas, sin ninguna marca más en las alas o cola. El obispillo es también de un color amarillo-verdoso. El dimorfismo sexual está patente en la cara, pecho y zonas inferiores del macho de un color más amarillento y llamativo, y un color gris ceniza que contrasta mucho más que el de la hembra. El hábitat típico son zonas altas con transición de bosque (habitualmente pinares o abedulares) a claros o praderas.



Verderón común /Greenfinch (*Chloris chloris*)

Salamanca: Residente

Tamaño relativamente grande con un cuerpo y pico robustos. Los bordes amarillos de las primarias forman un panel amarillo característico. En vuelo son visibles zonas amarillas de las alas en las primarias y en la base de la cola (como el lúgano). El dimorfismo sexual es acusado en los colores, siendo la hembra mucho más apagada con mucho gris y escaso verde y todo lo contrario en el macho, completamente verde oliva salvo por el amarillo de las alas y cola, y la mejilla de color gris. Abundante y habitual en diversos hábitats, desde zonas urbanas y huertos a bosques.



Pinzón vulgar /Chaffinch (*Fringilla coelebs*)

Salamanca: Residente

Tamaño de un gorrión, pero más estilizado y con la cola más larga. Reconocible por la doble banda blanca/pálida en las alas (aunque no siempre son visibles ambas cuando está posado), caudales externas blancas y obispillo gris, rasgos visibles en vuelo. Dimorfismo sexual apreciable en las variaciones cromáticas, la hembra más críptica y plana, y el macho con tonos rojizos en cara y pecho, grises, más contrastado en época de cría, cuando son apreciables los paneles alares totalmente blancos y una marca negra en la frente. Muy abundantes en todo tipo de hábitats arbolados.



Pinzón real /Brambling (*Fringilla montifringilla*)

Salamanca: Invernante

Tamaño y forma igual que el pinzón vulgar, pero muy reconocible por el obispillo blanco, la ausencia de blanco en la cola, el naranja del pecho que contrasta con el blanco de las zonas inferiores, y el color y punteado de los flancos. Tiene las mismas bandas alares que el pinzón vulgar, pero en el real tienen un color más oxidado. El dimorfismo sexual es apreciable por el diseño facial y el naranja más fuerte en los machos. En plumaje nupcial (en Salamanca se puede ver algún ejemplar tardío en el periodo de muda a este), el macho adquiere un color negro en toda la cabeza y parte del manto. No es una especie frecuente, se suele ver en bandos mixtos con pinzones vulgares u otros fringílidos durante el invierno. (Escuchar un macho cantando es improbable).



Picogordo común /Hawfinch (*Coccothraustes coccothraustes*)

Salamanca: Residente


Bastante grande y con unas proporciones inconfundibles: cuerpo robusto, cola corta, y gran cabeza y cuello. Pico muy robusto y fuerte (puede ejercer más de 50 kg de fuerza). Son dominantes los tonos ocre, con presencia de blanco y de negro. En verano los colores son algo más anaranjados y el pico pasa de un color marronáceo a azul oscuro. En vuelo se observa la banda blanca de las alas. El dimorfismo sexual no es muy pronunciado, siendo colores algo variables, pero en el macho tiene todas las rémiges negras y azules mientras que la hembra tiene un panel gris en las secundarias. Un ave bastante tímida que habita zonas arboladas de coníferas, robles, melojos, fresnos, olmos, etc. También se alimenta de los pipos de las cerezas. Es observable en el parque de los Jesuitas.



Camachuelo común /Bullfinch (*Pyrrhula pyrrhula*)

Salamanca: Invernante

Inconfundible. De tamaño relativamente grande y proporciones características, teniendo un aspecto redondeado como si no tuviera cuello, con un pico corto, ancho y robusto. En vuelo destaca mucho su obispillo blanco en contraste con la cola negra, espalda gris, y alas negras con la banda blanquecina. Tienen un capirote negro que forma parte del conjunto que lo hace difícil de confundir con cualquier ave. El dimorfismo sexual es patente siendo el macho rojo desde la mejilla a las partes inferiores, mientras que la hembra es de color gris. Están presentes en las huertas de algunos pueblos serranos del sur de la provincia. (Improbable escuchar su canto).



Piquituerto común /Common crossbill (*Loxia curvirostra*)

Salamanca: Residente


Aspecto particular, siendo de tamaño similar a un pinzón, pero con una cabeza proporcionalmente más grande y su pico robusto y cruzado, único entre las especies de fringílidos peninsulares. De colores bastante uniformes sin estriado (excepto juveniles). El dimorfismo sexual también es patente en la gama cromática, siendo los machos mayormente rojos (con cierta presencia de verde-amarillento), mientras que la hembra es de color verde y gris, con el obispillo amarillento. Está presente en grandes pinares del sur provincial. Debido a su dieta basada en piñones fundamentalmente, se reproduce en invierno. Amplio repertorio de sonidos.



Pardillo común /Linnet (*Linaria cannabina*)

Salamanca: Residente

De tamaño pequeño-medio, estilizado y con una cola bastante larga y un pico relativamente corto. Tiene un manto marrón y una garganta pálida con algunas marcas difusas en la zona central. Normalmente es apreciable una zona más pálida por encima y por debajo del ojo y en el medio de la mejilla. Las primarias tienen bordes blancos. El dimorfismo sexual se centra en el píleo y pecho, que son rojos en el macho (en verano, en invierno es un marrón rojizo), teniendo una nuca gris uniforme, mientras que la hembra tiene tonos pálidos y marrones en todo el cuerpo, con un estriado en el pecho y flancos algo más marcado que el macho. Muy abundante, presente en diversos hábitats.



Pardillo alpino /Lesser redpoll (*Acanthis cabaret*)

Salamanca: Rareza extrema. Enero 2021 (Tino Fernández)

De tamaño similar a un pardillo, con un estriado mucho más marcado, un pico típico de fringílido de color amarillo con el culmen (parte superior) oscuro. Tiene mentón y lista loreal (entre ojo y pico) negros, y barras alares blancas/pálidas ausentes en el pardillo común. También tiene la frente roja presente en ambos sexos. Excepto con machos adultos que tienen el pecho rojo, los sexos pueden ser difíciles de separar. Es un ave que cría en Escandinavia e inverna en centro Europa, por lo que su presencia en España se limita a citas aisladas, siendo la del Parque de los Jerónimos en 2021 la primera para Salamanca. (Totalmente improbable escuchar su canto).